

EEN PAAR ZILVERMEEUWEN (Larus argentatus) BROEDEND OP EEN KNOTWILG.

Zowel in 1965 als in 1966 kwam te Axel (Zeeuws-Vlaanderen) een paar Zilvermeeuwen op een knotwilg tot broeden.

De knotwilg stond te midden van een ondergelopen weide, die door dijken omringd was en omgeven door uitgestrekte spuitvelden. Op geringe afstand van de knotwilg lag een dijk, die regelmatig bewandeld werd en van waarop men het nest goed kon zien. Niettegenstaande zich meerdere andere knotwilgen in de naaste omgeving van het nest bevonden, werd twee jaar achtereenvolgens dezelfde boom gekozen. Steeds zat een vogel op het nest, terwijl het andere exemplaar meestal op het water de wacht hield. Bij het betreden van de dijk vlogen beide vogels alarmerend op, om naar het nest terug te keren zodra de dijk weer vrij was.

In beide jaren bleef een broedresultaat uit; naar alle waarschijnlijkheid zijn de beide legsels door Zwarte Kraaien (*Corvus corone*) geroofd.

Buiten het feit dat het hier om een eigenaardige broedplaats ging, is het broeden van Zilvermeeuwen in het binnenland van Zeeuws-Vlaanderen een merkwaardig verschijnsel.

Sinds lang is bekend dat Zilvermeeuwen op onverwachte plaatsen tot broeden kunnen komen. Reeds Reiser (1894) beschreef in de vorige eeuw het broeden van deze soort op de daken van de huizen aan de Bulgaarse kust. Meerdere auteurs (Mauersberger (1960), Mountfort en Ferguson-Lees (1961)) hebben dit later bevestigd. Ook in Engeland komt zulks af en toe voor, maar Took (1955) vond in 1954 minstens 200 paar Zilvermeeuwen, broedend op de daken van Dover.

Dat Zilvermeeuwen ook op knotwilgen durven broeden, lijkt in de literatuur nog niet beschreven. Wel is dit het geval bij de Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) onlangs vastgesteld (Dittberner (1965)).

SUMMARY:

HERRING GULLS BREEDING IN A HEADED WILLOW

During two consecutive years, 1965 and 1966, a pair of Herring Gulls nested in a headed willow near Axel (Netherlands Z. Flanders). The tree stood in the middle of a flooded meadow-land, between other willows. There were no nestresults, the eggs probably being stolen by Carrion Crows.

Some other data on abnormal nesting of Herring Gulls are given from the literature.

LITERATUUR:

- Dittberner, H. en W. (1965): Aussergewöhnliche Nistplatzwahl der Lachmöwe, *Larus ridibundus*. Beitr. z. Vogelk. 10, 5: 387—396.
 Mauersberger, G. (1960): Faunistische Notizen aus Nordost-Bulgarien. Journ. f. Ornith. 101: 113—125.
 Mountfort, G. en Ferguson-Lees, I. J. (1961): Observations on the birds of Bulgaria. Ibis 103a, 3: 443—471.
 Reiser, O. (1894): Materialien zu einer Ornith. II Bulgarien. Wien.
 Took, G. E. (1955): Nesting of Herring Gulls on rooftops in Dover. Brit. Birds 48, 2: 88—89.

J. van Impe.