

- KUMERLOEVE (H.) (1957). — Ornithologische Beobachtungen im « Zubringerraum » (Bulgarisch — Rumänische Schwarzmeerküste) des Bosphoruszuges. *Bonn. Zool. Beitr.*, 8 : 248-274.
- MUNTEANU (D.) (1966). — Ornithologische Beobachtungen an der rumänischen Schwarzmeerküste. *Egretta*, 9, 1 : 8-11.
- PAPADOPOL (A.) (1963). — Researches on the birds of the Black Sea littoral and the Dobrudja littoral lakes. *Comm. de Zool.*, 2 : 159-181.

J. VAN IMPE
Gand (Belgique)

Sur la migration d'automne de *Larus minutus* Pallas dans le sud-est de la Roumanie.

Nos excursions en Dobroudja pendant les automnes de 1965, 1966 et 1968 ont particulièrement tiré notre attention sur la présence de la Mouette pygmée dans cette région. Si l'on compare ce que LINTIA (1955) écrivait de cette espèce comme migrateur d'automne en Roumanie aux publications d'auteurs plus récents (PAPADOPOL (1963), DORNBUSCH et GREMPE (1965), MUNTEANU (1966), VASILIU (1968)), tout porte à croire que le nombre des *Larus minutus* migrateurs a considérablement augmenté les dernières années en Roumanie. Pourtant peu d'observateurs ont essayé jusqu'ici de dénombrer les passages.

En nous référant à une de nos publications antérieures, le nombre de *Larus minutus*, résidant dans le secteur sud-est de la Roumanie en septembre 1966, serait de plus de 5.000 exemplaires. En août 1968 nous avons fait un nouveau recensement, dans le but de vérifier si leur présence nombreuse observée en septembre 1966 n'était pas le fait d'un incident fortuit. Pour obtenir une vue assez complète sur l'intensité de la migration, deux endroits de prédilection de cette espèce, à savoir le Lac Techirghiol et la côte devant le poste d'observation à Agigea, ont été pris en considération.

Ainsi le 14-VIII-1968, le Lac Techirghiol hébergeait de 5.000 à 5.100 ex. Le 30-VIII cependant, leur nombre en augmentation comporte plus de 5.500 ex., dont 1.400 étaient dispersés dans les parties sud et est. Pendant la période du 8-VIII jusqu'au 29-VIII, 3.304 ex. ont migré devant le poste d'observation d'Agigea. Ce chiffre se rapporte seulement à une observation de 31 heures, soit une moyenne de 106,5 ex. par heure. Compte tenu de plusieurs facteurs, nous estimons que le nombre de *Larus minutus* ayant passé Agigea pendant tout le mois d'août 1968 surpasse le minimum de 9.000 ex., ce chiffre ne comprenant pas le nombre de séjournants ni le très grand rassemblement du Lac Techirghiol.

Ceci fait ressortir que le nombre de migrateurs de *Larus minutus* en septembre 1966 a été surpassé en août 1968 et que la migration d'automne de la Mouette pygmée sur la côte roumaine de la Mer Noire est plus forte que celle admise par KUMERLOEVE (1965) pour la côte anatolienne.

RÉFÉRENCES

- DORNBUSCH (M.) et GREMPE (G.) (1965). — Ornithologische Beobachtungen im Küstengebiet der Dobrudscha (Rumän'en). *Beitr. z. Vogelk.*, 11 : 132-152.
- KUMERLOEVE (H.) (1965). — La migration de la Mouette pygmée (*Larus minutus* Pallas) sur la côte anatolienne de la Mer Noire. *Alauda*, 33 : 69.
- LINTIA (D.) (1955). — Păsările din R. P. R. Vol. AI III-Lea. Bucarest.

- MUNTEANU (D.) (1966). — Ornithologische Beobachtungen an der rumänischen Schwarzmeerküste. *Egretta*, 9, I : 8-II.
- PAPADOPOULOS (A.) (1963). — Researches on the birds of the Black Sea littoral and the Dobrudscha littoral lakes. *Comm. de Zool.*, II : 159-181.
- VAN IMPE (J.) (1968). — Neue Angaben über die rumänische ornithofauna. *Gerf.*, 58 : 139-147.
- VASILIU (G. D.) (1968). — *Systema avium Romaniae*. Paris.

J. VAN IMPE
Gand (Belgique)