

Passage régulier de *Puffinus p. yelkouan* (Acerbi) et de *Stercorarius pomarinus* (Temm.) le long de la côte roumaine.

Lors de nos investigations en Dobroudja pendant les automnes 1966 et 1968, nous nous sommes rendu compte d'un passage régulier à la côte de *Puffinus p. yelkouan* et de *Stercorarius pomarinus*, deux espèces précédemment peu connues en Roumanie.

Bien que selon beaucoup d'auteurs *Puffinus p. yelkouan* soit une apparition très fréquente au large du Bosphore et des Dardanelles, sa rareté devant les côtes bulgares (DONCEV (1964)) et roumaines (LINTIA (1955)) était bien frappante. Dans son ouvrage récent « Systema avium Romaniae », VASILIU (1968) qualifie les quelques indications sur la présence de *Puffinus p. yelkouan* comme incertaines. Le statut énoncé dans la nouvelle avifaune susdite : « Espèce signalée sur les côtes de la Mer Noire de la Dobroudja », ne se réfère qu'à l'étude de DORNBUSCH et GREMPE (1965) qui signalent avoir rencontré en tout 2 ex. le 15. VIII. 1961.

Déjà DOMBROWSKI (1946) présumait que *Puffinus p. yelkouan* pouvait être vu assez souvent en mer roumaine. Aussi nos observations personnelles d'août 1968, faites devant la « Station de Recherches Marines (Prof. BORCEA) » à Agigea, mettent en évidence un passage régulier de cette espèce. Pendant 31 heures d'observation constante à différentes dates entre le 8. VIII et le 29. VIII. 1968, l'espèce s'est montrée pendant 17 heures, avec au moins 41 ex. distincts et le nombre maximum d'oiseaux distincts observés par heure était de 12 ex. Direction de vol de tous les Puffins observés : Sud, 37 ex. ; Nord, 25 ex. et sans direction, 5 ex.

Pour ce qui est de la présence du Labbe pomarin devant la côte roumaine et à d'autres endroits de la Mer Noire, des données précises nous font défaut (KUMERLOEVE (1962)). VASILIU (l. c.), se basant sur la confirmation d'anciens auteurs, conclut que l'espèce se présente « isolément sur les côtes de la Mer Noire pendant le passage d'automne », ce qui est confirmé aussi par PAPADOPOUL (1966). Tandis que les observations de DORNBUSCH et GREMPE (l. c.) portant sur un total de 13 ex. du 24. VIII jusqu'au 1. IX. 1960, et les données

plus anciennes de HEINRICH (1927) rencontrent notre conclusion d'une apparition plutôt régulière.

Pendant deux mois d'observation (septembre 1966 et août 1968), j'ai vu 32 ex. du Labbe pomarin. Toutes les observations ont été faites devant la côte d'Agigea, sauf deux qui se situent entre Mamaia et Capul Midia. Les oiseaux contrôlés individuellement étaient tous de la phase claire. Ne tenant compte que des Labbes qui prenaient une direction fixe en août 1968, 18 ex. sur 19 volaient vers le sud, tandis qu'en septembre 1966 la plupart (8 ex. sur 9) se dirigeaient vers le Nord. Cette contradiction laisse supposer que *Stercorarius pomarinus* peut être considéré, non seulement comme migrateur sur la côte roumaine, mais aussi comme séjournant à cet endroit.

REFERENCES

- DOMBROWSKI, R., 1946. — Pasarile Romîniei (Ornis Romaniae). Traducere, completare si ilustrare de D. Lintia. Bucarest.
- DONCEV, S., 1964. — Über die Verbreitung einiger neuer und seltener Vögel in Bulgarien. Izv. Zool. Inst. Sofiya, 16 : 23-28.
- DORNBUSCH, M. et GREMPE, G., 1965. — Ornithologische Beobachtungen im Küstengebiet der Dobrudscha (Rumänien). Beitr. z. Vogelk., 11, 3 : 132-152.
- HEINRICH, G., 1927. — Dobrudschareise 1925. J. Orn., 75 : 6-37.
- KUMERLOEVE, H., 1962. — Zur Kenntnis der Avifauna Kleinasien. Bonn. Zool. Beitr., 12 Sonderheft : 1-318.
- LINTIA, D., 1955. — Pasarile din R. P. R., Vol. AI III-Lea. Bucarest.
- PAPADOPOL, A., 1966. — Les Charadriiformes de Roumanie. Trav. Mus. Hist. Nat. « Gr. Antipa », VI : 227-247.
- VASILIU, G. D., 1968. — Systema avium Romaniae. Paris.

J. VAN IMPE,
Rooseveltlaan 9, Gand, Belgique.