

T

Taraxacum alpinum - Alpenpaardebloem
Taraxacum officinale - Paardebloem
Thalictrum alpinum - Alpenruit
Thalictrum aquilegifolium - Grote ruit
 (Akeleiruit)

Thymus serpyllum - Wilde tijm
Tragopogon pratensis - Gele morgenster
Trifolium campestre - Liggende klaver
Trifolium montanum - Bergklaver
Trifolium pratense - Rode klaver
Trifolium repens - Witte klaver
Triglochin palustris - Moeraszoutgras
Trollius europaeus - Trollius
Tussilago fanfara - Klein hoefblad

V

Vaccinium myrtillus - Bosbes
Veratrum album - Dodenwaad
Verbascum nigrum - Zwarte toorts
Veronica alpina - Alpenereprijs
Veronica beccabunga - Beekpunge
Veronica bellidoides - Madeliefereprijs
Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs
Veronica fructiculosa - Struikachtige ereprijs

Vicia cracca - Vogelwikke
Viola arvensis - Akkerviooltje
Viola biflora - Tweebloemig viooltje
Viola tricolor - Driekleurig viooltje
Vitis idaea - Rode bosbes

L. De Grauwe, R. Olivié.

Aanhangsel III**DEELNEMING PĒR AFDELING**

Antwerpen-Centrum : 1
 Antwerpen-Zuid : 4
 Brugge : 1
 Brussel : 1
 Essen : 2
 Gent : 2
 Hageland-Zuiderkempen : 1
 Herentals : 1
 Land van Waas : 5
 Leuven : 3
 Lier : 1
 Mandelstreek : 1
 Mechelen : 2
 Turnhout : 1
 Westkust : 2
 Zuid-Limburg : 2

17

Tweede rapport van het Belgisch avifaunistisch homologatiecomité (NEDERLANDSTALIGE AFDELING)

jaar 1968

door het B.A.H.C. (Ned.)
 sekretaris : J. Van Impe.

Voor de samenstelling van dit tweede rapport zijn meerdere vergaderingen belegd en werden verschillende dossiers aan de leden doorgestuurd. Bij het verschijnen van de „Avifauna van België” bleven enkele gevallen onbehandeld. Deze zijn nu in dit rapport verwerkt, waardoor een achterstand werd ingelopen.

Langs deze weg danken de leden alle personen, die door het geven van inlichtingen tot de samenstelling van dit rapport hebben bijgedragen. De medewerkers mogen er van overtuigd zijn dat

het tweede rapport samen met het vorige, een aanzienlijke bijdrage voor 's lands avifauna betekent.

Het B.A.H.C. (Ned.) was voor de werkzaamheden 1967-1968 samengesteld als volgt : de heren Fr. Grootaers, P. Herroelen, G. Huyskens, B. Van Damme, H. Van der Vloet, P. Van Hecke, J. Van Impe en H. Voet.

Voor de in de tekst gebruikte afkortingen, zie De W. 1970, jg. 36 : 67. Is de datum niet voorafgegaan door een jaartal, wordt het jaar 1968 bedoeld.



IJseend

Foto : W. Suetens.

SYSTEMATISCHE LIJST.

Fulmarus glacialis ssp. - Noordse stormvogel

* 16.1, Bredene (W.-Vl.), W. 34 : 118 en W. Corveleyn in litt.;

* 22.3, Zwin/Knokke (W.-Vl.) (L. Lip-pens) k.K.B.I.N..

Egretta garzetta - Kleine zilverreiger

21.4, Neerijse (Brab.), Orn. Brab. 33 : 6 en W. 35 : 93;

3.6, Mol (Antw.), 3 eks.. W. 35 : 49;

3 tot 13.9, Leffinge (W.-Vl.), W. 35 : 19 en W. Corveleyn, k.K.B.I.N..

Ciconia nigra - Zwarte ooievaar

29.4, Woumen (W.-Vl.), W. 34 : 190.

Aythya nyroca - Witoogeend

* 1963 : 7.11, Koksijde (W.-Vl.), ♂, G. 57 : 7.

1966 : 10.12 tot 7.1.67, Arendonk (Antw.), 2 eks.. W. 33 : 329;

1966 : 20.12, Retie (Antw.) (R. Bosmans) k.K.B.I.N..

1968 : 29.8, Antwerpen-Linkeroever, ad. (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N.;

8.9 tot 30.10, Retie (Antw., ♂. W. 35 : 20, 29 en 81;

26.10, Kalmthout (Antw.), juv. (B. Van Damme, H. Voet) k.K.B.I.N.;

9.11, id., ♀ of juv. (H. Voet) k.K.B.I.N..

Clangula hyemalis - IJseend

1966 : 4 tot 19.11. Loppem (W.-Vl.), 1 paar, W. 34 : 9.

Tadorna ferruginea - Casarca

1.9 tot 20.10, Zandvliet (Antw.), ♀ of juv. (J. De Ridder, L. De Bièvre, L. Wens) k.K.B.I.N..

Mogelijkheid van ontsnapping uit gevangenschap niet uitgesloten (Com.).

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

12.1, Perk (Brab.) (A. Van Speybroeck) k.K.B.I.N.;

16.9, Wommelgem (Antw.), W. 35 : 20 en Kr. Van Scharen in litt.;

24.11, Retie (Antw.), W. 35 : 82 en Fr. Daemen in litt.;

16 tot 27.12, Bornem (Antw.) (J. Van Riet, H. D'Hertefeldt) in litt. K.B.I.N..

Falco vespertinus - Roodpootvalk

1967 : einde sept. Furfooz (Nam.), juv., G. 59 : 34 en M. Vercammen, met dia's en in litt..

v 1968 : 28.8, Brasschaat (Antw.), twee-dejaars ♀, G. 59 : 31 en 290.

Porzana parva - Klein waterhoen

v 17.4, Tongeren (Limb.), ♀ (R. Christiaens) met 4 dia's als bewijsmateriaal.

Porzana pusilla - Kleinst waterhoen

* 19.2, Knokke (W.-Vl.), W. 34 : 192 en M. Koopman in litt.;

16.7, Kalmthout-Nieuwmoer (Antw.) (J. De Ridder) k.K.B.I.N..

Charadrius morinellus - Morinelplevier

30 39.8, Kalmthout (Antw.) (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N..

Calidris maritima - Paarse strandloper

29.7, Bredene (W.-Vl.), 4 eks., W. 34 : 355 en W. Corveleyn in litt..

Dit is de eerste juliwaarneming voor ons land. In Nederland zijn 3 juliwaarnemingen bekend, alle afkomstig van de Waddeneilanden (Lim. 35 : 61 en 36 : 26) (sekr.).

Himantopus himantopus - Steltkluut

Broedgeval :

Oorderen (Antw.), nest met 5 eieren, later vermoedelijk door ratten geroofd, G. 59 : 24 en k.K.B.I.N..

Waarnemingen :

19.4, Halle (Brab.), Orn. Brab. 33 : 8, G. 59 : 25 en k.K.B.I.N.;

27.4 tot 13.8, Antwerpse polders, onafgebroken aanwezig, maximum een tiental vogels, om. 5.7 en 28.7 resp. 11 en 10 eks., G. 59 : 24;

25.5, Knokke (W.-Vl.), G. 59 : 25 en k.K.B.I.N.;

30.5, 8.7 en 21.7, Evergem-Sluizen (O.-Vl.), resp. 2, 1 en 2 ad., G. 59 : 25.

Phalaropus lobatus - Grauwe franjepoot

29.8, Oorderen (Antw.) (H. Franken, H. Voet) k.K.B.I.N..

Stercorarius skua - Grote jager

22.9, Zandvliet (Antw.) (J. De Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

26.9, Zwin/Knokke (W.-Vl.), Bull. B. N.V.R. 1968 : 113;

28.9, Oostende (W.-Vl.), W. 35 : 21 en M. Becuwe in litt.;

4.10, Bredene (W.-Vl.), W. 35 : 21 en k.K.B.I.N.;

5.10, De Panne (W.-Vl.), G. 59 : 207 en k.K.B.I.N.;

* 31.12, Bredene (W.-Vl.), W. 35 : 112 en W. Corveleyn in litt..

Larus hyperboreus - ^{Grote} Burgemeester

3.6, Antwerpen-Linkeroever, juv. (B. Van Damme, N. Debrun, Goethals, H. Voet) k.K.B.I.N..

Larus argentatus - Zilvermeeuw

Broedgeval :

Zwin/Knokke (W.-Vl.), 1 paar. Nest met 3 eieren gevonden op 21.6; enkele dagen later werd het legsel door springvloed vernietigd (L. Lippens), in litt. K.B.I.N. en Bull. B.N.V.R. 1968 : 113.

Larus argentatus ssp. - Geelpootzilvermeeuw

1967 :

6.8 tot 24.9, Zandvliet (Antw.), 5 waarnemingen met in totaal 16 eks. (J. De

Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

29.10, id. 3 eks. (J. De Ridder, L. Wens) id..

1968 :

7.7., Zeebrugge (W.-Vl.), 3 eks. (J. Van Impe) k.K.B.I.N.;

4 en 15.8, Zandvliet (Antw.), resp. 1 en 6 eks. (J. De Ridder) id.;

3 en 6.9, Bredene (W.-Vl.), resp. 5 en 1 eks., W. 35 : 21.

Larus glaucooides - Kleine burgemeester

6.4, Zelzate-Overslag (O.-Vl.), juv., W. 34 : 247.

Dit is het derde geval voor ons land en tevens de eerste veldwaarneming (Com.).

Larus melanocephalus - Zwartkopmeeuw

24.3, 7 tot 9.4, Zwin/Knokke (W.-Vl.), 2 ad., Bull. B.N.V.R. 1968 : 113; L. Lippens en K. De Smet in litt.;

6 en 20.4, Kalmthout (Antw.), resp. 4 en 2 ad. (G. Bulteel, J. De Ridder, L. Wens) k.K.B.I.N.;

5 en 9.7, Zeebrugge (W.-Vl.), ad. (K. De Smet) k.K.B.I.N..

Chlidonias leucopterus - Witvleugelstern

18.5, Antwerpen-Linkeroever, 2 eks. (G. Bulteel) k.K.B.I.N.;

19.5, Virelles (Hen.) (G. Huyskens) k.K.B.I.N..

Chlidonias hybrida - Witwangstern

26.5, Ekeren (Antw.) (H. Franken, B. Van Damme, H. Voet) k.K.B.I.N..

Gelochelidon nilotica - Lachstern

29.9, Zandvliet (Antw.) (J. De Ridder, L. Wens, L. De Bièvre, G. Bulteel) k.K.B.I.N..

Hydroprogne caspia - Reuzenstern

29.7, Drongen (O.-Vl.), W. 34 : 364 en

K. De Smet, k.K.B.I.N..

Alca torda torda - Grote alk

* 1966 : 19-22.2, tussen Nieuwpoort en De Haan/Klemskerke (W.-Vl.) (vleugell. 208 mm, snavell. 35 mm en snavelhoogte 21,5 mm) E. Kuyken, in litt. K.B.I.N..

* 1967 : 6.2, tussen Bredene en De Haan/Klemskerke (W.-Vl.), Stentor 5 : 46, Amœba 43 : 125 en E. Kuyken, in litt. K.B.I.N..

Fratercula arctica - Papegaaiduiker

24.8, De Panne (W.-Vl.), G. 59 : 217 en k.K.B.I.N..

Pterocles orientalis - Zwartbuikzandhoen

1961 : 29.5 tot 9.6, Nieuwpoort-IJzermondig (W.-Vl.), 3 eks. [J. Coopman (29.5); J. Decommines en L. Houtsaegeer (2.6); P. Houwen, A. en S. Lapeire (9.6)].

[Samenvatting van de verschillende veldnota's : hoenderachtige vogels met zwarte buik en puntig achterlijf; grootte tussen goudplevier en patrijs. In vlucht prachtige oranje kleur op de rug en de vleugels; slagpennen gaven de indruk bleker te zijn, waren ongeveer blauw-zandkleurig. In zit oranje rug, formeel goed herkend. Roep : „turk-turk-turk”, ongeveer aanhoudend, niet snel achtereen. Zowel enkelvoudige als tweeledige roepen. (sekr.)].

Dit is het tweede geval voor ons land; het vorige dateert uit 1917 (Avif. v. Belg., G. 57 : 327) (Com).

Bubo bubo - Oehoe

1967 : half augustus tot 15.9, Kwaadmechelen (Limb.) (J. Clygnet).

Een uitvoerige beschrijving van deze waarneming berust in het K.B.I.N.. Volgens de Avif. v. Belg. (G. 57 : 329) dateert het laatste broedgeval in ons land uit 1907 en de laatste waarneming had plaats in 1937.

De verspreiding van *Bubo bubo* in de buurlanden is alarmerend. In het Groothertogdom Luxemburg broedde de oehoe tot de jaren 1930; de meest recente vondst dateert uit 1950 (Hulten en Wassenich, Vogelfauna Luxemburgs, 1961 : 442). In Frankrijk heeft de soort de Ardennen, de Vogezes, de Côte d'Or en de Jura blijkbaar verlaten (Thiollay, Alauda, 37 : 15). In Westfalen broedde de oehoe tot 1909 en werd sindsdien nog eenmaal gezien (Peitzmeier, Avifauna Westfalen, 1969 : 304). In een pathetisch artikel beschrijft März (Falke, 7 : 231) de toestand voor West- en Oost-Duitsland : in 1966 nog 33 paar, waarvan volgens deze auteur 20 p. in Beieren, Opper-Beieren en de rest in Oost-Duitsland. De oehoe verdween uit het Rijnland, waar in 1953 nog 10 paar broedden (sekr.).

Merops apiaster - Bijeneter

1967 : 18.5, Uitbergen (O.-Vl.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

Calandrella cinerea - Kortteenleeuwerik



Kortteenleeuwerik.

Foto : Adh. Lagrou.

v 1967 : 15.10, Hasselt (Limb.) (F. Van Cauteren en L. Nef) met dia's en k.K.B.I.N..

Anthus richardi - Grote pieper

v 1967 : 1.10, Westkapelle (W.-Vl.), 2 eks. (A. Van Parijs) k.K.B.I.N.;

1967 : v 15.10, Zwin/Knokke (W.-Vl.) (L. Claes, Baron Van Caloen, G. De Bruycker) id..

v 1968 : 13.10, Retie (Antw.) (J. Spaepen) k.K.B.I.N..

Anthus cervinus - Roodkeelpieper

v 22 en 30.9, Retie (Antw.), telkens 1 eks. (J. Spaepen) k.K.B.I.N..

Anthus spinoleita littoralis - Oeverpieper

v 27.10, Messelbroek (Brab.) (M. Clerckx en Werkgroep Demervallei) k.K.B.I.N..

Motacilla alba yarrellii - Rouwkwikstaart

1967 : 11.3, Loppem (W.-Vl.) (G. Burggraeve) in litt. K.B.I.N.;

1967 : 15.21 en 30.3, Oostkamp (W.-Vl.), telkens 2 eks. (id.).

1968 : 5.4, Oostkamp (W.-Vl.), 2 eks. (G. Burggraeve) in litt. K.B.I.N.;

12.4, Knokke (W.-Vl.), Bull. B.N.V.R. 1968, 116 en L. Lippens, k.K.B.I.N. (de datum is 12.4).

Motacilla flava flavissima - Engelse gele kwikstaart

1967 :

Mogelijk broedgeval :

Zeebrugge (W.-Vl.), 22.6, 1 alarmerend ♂ (J. Van Impe); 1.7, ♂ met aas, gedurende 15 min. alarmerend, geen nest gevonden (G. Burggraeve) k.K.B.I.N..

Waarneming :

19.7, Zeebrugge (W.-Vl.) (J. Van Impe) k.K.B.I.N..

1968 :

31.3, Hamme (O.-Vl.), 1 (geen 2) eks., W. 34 : 227 en A. Reyms in litt.;

10.4, Nieuwpoort (W.-Vl.), ♂ (P. Herroelen, W. Noll) k.K.B.I.N.;

17.4, Westende (W.-Vl.), ♀ (P. Herroelen) k.K.B.I.N.;

23.4, Zandvoorde (W.-Vl.), ♂, W. 34 : 194 en W. Corveleyn in litt.;

5.5, Zeebrugge (W.-Vl.), 1 paar (J. Van Impe) k.K.B.I.N..

Motacilla flava thunbergi - Noordse gele kwikstaart

20.5, Harchies (Hen.), 2 ♂♂ (W. Roggeman, P. Van Hecke, E. Kuyken, Prof. Hublé) k.K.B.I.N.;

12.9, Ninove (O.-Vl.), ♂ (W. Roggeman, E. De Block) id..

Motacilla flava feldegg - Balkan gele kwikstaart

1967 : 7.5, Genk (Limb.), W. 33 : 180 en Orn. Brab. 36 : 5.

Dit is de eerste vaststelling van de Balkan gele kwikstaart in ons land. Alhoewel in vroegere publikaties erop gewezen is dat volledig zwartkoppige gele kwikstaarten in de Noordse gele kwikstaart (*Motacilla flava thunbergi*)-populatie zouden voorkomen, is deze mening door later onderzoek (Sammalisto, Ornisc Fennica, XXXIII : 15) niet meer bevestigd.

Interessant in verband met deze eerste waarneming is de studie van Leisler (*Egretta* 11 : 6), die er op wijst dat de Balkan gele kwikstaart in noordwestelijke richting schijnt uit te breiden. Naast meerdere waarnemingen deden zich in 1968 2 broedgevallen voor in Oostenrijk (Blum en Samwald. *ibid.*, p. 1 en 4) en één in 1969 (Adam, Orn. Mitt. 22 : 19). Schifferli (Orn. Beob. 65 : 38) vermeldt zelfs een broedgeval voor Zwitserland in 1967. Citeren wij nog een tweede waarneming van de Balkan gele kwikstaart voor Nederland, eveneens in 1968

23.5, Zuidelijk Flevoland; N. Marra, (Lim. 42 : 230) (sekr.).

Bombycilla garrulus - Pestvogel

27.2, Westkapelle (W.-Vl.) (A. Van Parijs)k.K.B.I.N..

Turdus pilaris - Kramsvogel

20.6, Nevele (O.-Vl.), W. 34 : 337 en R. Boonaert in litt. K.B.I.N..

Dit is de eerste zomerwaarneming van deze soort in de Vlaamse landstreek (Com.).

Turdus migratorius - Roodborstlijster

v 1965 : januari tot 7.2, Heverlee (Brab.), ♀, Orn. Brab. 24 : 10.

De roodborstlijster broedt in Noord-Amerika van Newfoundland tot Alaska en zuidelijk tot Zuid-Mexico. Peters' Check-List of Birds of the World (1964, Vol. X : 226) vermeldt meerdere ondersoorten, bijna alle trekvogel. Het is niet gekend tot welke ondersoort dit eerste geval voor ons land behoort.

Tot en met 1967 werd *Turdus migratorius* zeker 11 maal in Groot-Brittannië vastgesteld; alle gevallen — uitgezonderd 2 — deden zich voor tussen oktober en februari (Brit. Birds 61 : 349). De roodborstlijster wordt als siervogel in Engeland ingevoerd, met als gevolg een verhoogde kans op ontsnapping. Toch wordt deze weer tegengesproken door het overwegend aantal winterwaarnemingen (Brit. Birds, id. en 60 : 324) (sekr.).

Cyanosylvia svecica svecica - Roodgesterde blauwborst

v 1967 : 8.5, Uitbergen (O.-Vl.), 2 ♂♂ (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

v 1968 : 21.4, Lillo (Antw.) (F. Boel, F. De Backer, J. De Ridder, R. Arnhem) k.K.B.I.N.;

v 22 en 25.4, Uitbergen (O.-Vl.), telkens 1 ♂ (W. Roggeman) id.;

14.5, Uitbergen (O.-Vl.), ♂ (W. Roggeman) id..

Cettia cetti - Cetti's zanger

Broedgeval :

Sint-Truiden (Limb.), W. 34 : 309 en G. 59 : 70.

Vangst :

v 28.5, Zwin/Knokke (W.-Vl.), Bull. B.N.V.R. 1968, 116 en L. Lippens in litt..

Dit is het eerste broedgeval van de Cetti's zanger in het Vlaamse land. Ook in hetzelfde jaar werd de soort voor het eerst in Nederland vastgesteld (H. Lehaen, Lim. 42 : 110). In 1969 steeg het aantal waarnemingen bij onze noorderburen tot 3 (provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland, Lim. 42 : 233). De noordwaartse expansie gaat dus onverminderd voort (sekr.).

Acrocephalus paludicola - Waterrietzanger

v 1967 : 8.9, Denderleeuw (O.-Vl.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

1968 :

10.8, Koksijde (W.-Vl.), W. 34 : 337 en H. Donckers in litt.;

11.8, Pervijze-Ramskapelle (W.-Vl.), W. 34 : 337 en K. Maertens in litt.;

v 5.9, Uitbergen (O.-Vl.) (W. Roggeman) k.K.B.I.N..

Phylloscopus bonelli - Bergfluit

v 5.5, Hoeilaart (Brab.), ♂, Orn. Brab. 36 : 1 en J. Vanstallen, J. Arnhem en M. Steensels, k.K.B.I.N..

De Avif. v. Belg. G. 57 : 349, meldt slechts één geval (Dinant, 1899). In 1966 werd de bergfluit in ons land gemeld in de provincies Henegouwen en Namen (A. 5 : 80). Voor het jaar 1967 werden 3 meldingen gesignaleerd (A. 6 : 134) en deed zich een broedgeval voor in de provincie Luxemburg (Demaret, A. en P., A. 4 : 87). Naast de bovengenoemde

vangst van Hoeilaart, zijn uit 1968 nog drie andere gevallen bekend : twee uit de provincie Luxemburg en één uit de provincie Luik (A. 6 : 136) (sekr.).

Phylloscopus inornatus - Bladkoninkje

v 1.10, Schoten (Antw.), G. 59 : 112 en 352.

Ficedula hypoleuca - Bonte vliegenvanger

Broedgevallen :

Lichtaart (Antw.), Bull. B.N.V.R. 1968 : 89;

Schoten (Antw.), W. 35 : 54;

Dworp (Brab.) (V. Verdickt) k.K.B.I.N..

Panurus biarmicus - Baardmannetje

1967 :

Broedgevallen : Limburg, 10 paar (H. Lehaen) k.K.B.I.N..

Waarnemingen en vangsten :

januari, Waasmunster (O.-Vl.), Avif. Durmevallei, 1968, 253;

17.3, Evergem (O.-Vl.) (Prof. Hublé) k.K.B.I.N.;

23 en 27.9, 12 en 18.11, Hamont (Limb.), resp. 4 ♂♂ en 6 ♀♀ (eerste twee data) en 1 ♂ en 2 ♀♀ (laatste twee data) (H. Lehaen) k.K.B.I.N.;

v 22 en 23.10, Zwin/Knokke (W.-Vl.), resp. 1 paar en 1 ♂ (R. Van Caloen) k.K.B.I.N.;

22 en 29.10, Zandvliet (Antw.), resp. 4 en 16 eks. (J. De Ridder, H. Van der Vloet, H. Voet) k.K.B.I.N.;

1, 5, 13 en 20.11, id., resp. 13, 6, 3 en 13 eks. (id.) k.K.B.I.N..

29.11 en 1.12, Lillo (Antw.), resp. 7 en 6 eks. (F. Boel) k.K.B.I.N..

1968 :

21 en 22.1, Westkapelle (W.-Vl.), 2 eks. (G. Van Parijs) k.K.B.I.N.;

11 en 18.2, Zandvliet (Antw.) resp. 40 en 12 eks. (Vogelringstation Brasschaat) k.K.B.I.N.;

25.2, id., 2 eks., W. 35 : 27;

28.2, Blankenberge (W.-Vl.), 2 eks.,
W. 34 : 159;

28.2, Westkapelle (W.-Vl.), 1 paar (G.
Van Parijs) k.K.B.I.N.;

v 18.4, Hoeke (W.-Vl.), 1 paar, W. 34 :
193 en G. Vantorre in litt.;

24.11, Westkapelle (W.-Vl.), 2 eks. (G.
Van Parijs) k.K.B.I.N..

Emberiza cirius - Cirlgors

1965 : 20.5, 9 en 15.6, omgeving van
Ruien (O.-Vl.) (20.5 : ♂ met rupsen in
snavel en zang gehoord, ook ♀ gezien;
9.6 : roepend ♂; 15.6 : zingend ♂ en ook
♀ gezien: Broedgeval niet bewezen. (A.
Schamelhout) in litt. K.B.I.N..

Het gaat hier niet om een broedgeval
(contra : Koerier, 1966 : 31) (Com.).

Carduelis spinus - Sijs

1967 : broedgeval : Sint-Joris-Weert
(Brab.) (Th. Vreugde) k.K.B.I.N..

Het is niet uitgesloten dat het hier ging
om ontsnapte kooivogels (Com.).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula - Grote goudvink

v 1966 : 31.10 en 8.11, Schoten (Antw.),
telkens 1 eks. (D. de Cock de Rameyen)
k.K.B.I.N..

Pastor roseus - Roze spreeuw

v 1966 : 2.10, Essene (Brab.), juv. (W.
Roggeman) k.K.B.I.N..

NIET AANVAARDE GEVALLEN.

De inleidende opmerking voor de niet
aanvaarde gevallen van het eerste rap-
port (W. 36 : 75) is ook geldig voor het
tweede rapport. Zeker blijft hierbij be-
nadrukt dat het niet aanvaarden de
waarde van de waarnemer geenszins
vermindert.

Het comité vraagt aan de waarnemers
en de ringers een uitvoerige en zo volle-
dig mogelijke beschrijving van de te ho-

mologeren waarneming of vangst te pu-
bliceren of te berichten. Schaars gedoku-
menteerde waarnemingen of ringgeval-
len kunnen niet in aanmerking genomen
worden.

Gavia immer - IJsdruiker

1966 : 4.12, Westkapelle (W.-Vl.),
k.K.B.I.N..

Phaenicopterus ruber ssp - Flamingo

1967 : W. 33 : 306 en 332; W. 34 : 61.

1968 : Bull. B.N.V.R. 1968 : 112 en
k.K.B.I.N..

In het eerste geval ging het niet om de
Europese flamingo (*Phaenicopterus ruber
roseus*); in het tweede geval was deter-
minatie niet mogelijk (Com.).

Anas crecca carolensis -

Noordamerikaanse wintertaling

23.11, Hofstade (Brab.), k.K.B.I.N..

Anas acuta - Pijlstaart

1967 : broedgeval, Bull. B.N.V.R. 1967 :
60.

1968 : broedgeval, Bull. B.N.V.R. 1968 :
93.

Aythya nyroca - Witoogeend

W. 35 : 20 en k.K.B.I.N..

Buteo lagopus - Ruigpootbuizerd

1967 : Retie (Antw.) en Geel (Antw.),
W. 33 : 114 en 146; k.K.B.I.N..

Haliaeetus albicilla - Zeearend

1967 : W. 33 : 115 en G. 59 : 392;
k.K.B.I.N..

Falco subbuteo - Boomvalk

25.3, Westkapelle (W.-Vl.), k.K.B.I.N..

Falco vespertinus - Roodpootvalk

1 en 5.9, Brasschaat (Antw.), G. 59 :
34 en k.K.B.I.N..

- Porzana porzana* - Porseleinhoen
 Broedgeval : W. 36 : 61.
 Broedgeval werd nooit met zekerheid aangetoond (Com.).
- Porzana pusilla* - Kleinste waterhoen
 v 1967 : W. 34 : 55, G. 59 : 352 en k.K.B.I.N..
- Crex crex* - Kwartelkoning
 W. 35 : 111 en k.K.B.I.N..
- Gallinago media* - Poelsnip
 W. 34 : 158 en k.K.B.I.N..
- Larus hyperboreus* - Burgemeester
 18.2, Oostende (W.-Vl.), k.K.B.I.N.;
 W. 35 : 83.
- Larus glaucoides* - Kleine burgemeester
 1966 : 6.10, Oostende (W.-Vl.), k.K.B.I.N..
- Sterna paradisaea* - Noordse stern
 W. 34 : 364.
- Anthus richardi* - Grote pieper
 v Bull. B.N.V.R. 1968 : 116 en k.K.B.I.N..
- Anthus cervinus* - Roodkeelpieper
 Orn. Brab. 41 : 2.
- Motacilla flava flavissima* - Engelse gele kwikstaart
 v 1967 : 20.8, Lillo (Antw.), k.K.B.I.N..
 1968 : W. 34 : 365 en k.K.B.I.N..
- Lanius minor* - Kleine klapekster
 1965 : 13.11, Beervelde (O.-Vl.), k.K.B.I.N..
 1966 : 13 en 17.2, Oostduinkerke (W.-Vl.), k.K.B.I.N..
 1968 : W. 34 : 117.
- Monticola saxatilis* - Rode rotslijster
 1966 : 10.9, Oostduinkerke (W.-Vl.), k.K.B.I.N..
- Acrocephalus paludicola* - Waterrietzanger
 1965 en 1966 : april, juli, augustus en september, Avelgem (W.-Vl.), Meldren (O.-Vl.) en Tiegem (W.-Vl.), k.K.B.I.N..
- Sylvia melanocephala* - Kleine zwartkop
 1966 : 18 en 24.4, Bonheiden (Antw.), k.K.B.I.N..
- Phylloscopus collybita ibericus* - Iberische tjiptjaf
 v 5.5, Hoeilaart (Brab.), k.K.B.I.N..
- Ficedula parva* - Kleine vliegenvanger
 W. 34 : 365.
- Certhia familiaris* - Woudboomkruiper
 v 1966 : 9.4, 's Herenelderen (Limb.), k.K.B.I.N..
- Carduelis flammea flammea* - Grote barmsijs
 v 1967 : Schoten (Antw.), Ringersbull. 6 : 31.
- Serinus citrinella* - Citroensijs
 1964 : Messelbroek (Brab.) en Zaventem (Brab.), Orn. Brab. 22 : 6;
 1964 : W. 30 : 339.
 Al deze eks. zijn vrijwel zeker uit gevangenschap ontsnapt (Com.).
- Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* - Grote goudvink
 v 1965 : 4.11, Schoten (Antw.), k.K.B.I.N..
 v 1967 : 19.11, Kortenberg (Brab.), k.K.B.I.N..

Pinicola enucleator - Haakbek

4.7, Testelt (Brab.), Orn. Brab. 37 :
8-9 en k.K.B.I.N..

Loxia leucoptera - Witbandkruisbek

1966 : 20.6, Testelt (Brab.), k.K.B.I.N..

Petronia petronia - Rotsmus

v G. 59 : 114.

Eks. vrijwel zeker uit gevangenschap
ontsnapt (Com.).

Pyrrhonorax graculus - Alpenkauw

1963 : twee waarnemingen : Heverlee
(Brab) en Zele (O.-VI.), G. 54 : 76 en in
litt. K.B.I.N..

CORRIGENDA BIJ HET EERSTE RAPPORT (De W. 1970, jg. 36 : 66).

p. 68 *Egretta garzetta*

De twee waarnemingen van 21.5 be-
treffen hetzelfde eks. (H. Pluymers in
litt.).

p. 70 *Himantopus himantopus*

Uiterste data : 19.4, Halle (Brab.) :
Lees : Uiterste data : 30.4, Zandvliet
(Antw.).

p. 71 *Larus melanocephalus*

1.4, 2 ad. : inlassen : 1.4, Zeebrugge
(W.-VI.), 2 ad..

p. 73 *Oenanthe oenanthe leucorrhoea*

Eerste regel : Brasschaat (Antw.), ad. :
inlassen : ad. ♀.

p. 73 *Panurus biarmicus*

1966 : januari, 3 en 19, : lees : 3 tot 19
(A. Verstraeten in litt.).

p. 74 *Emberiza cirulus*

laatste week van oktober : inlassen :
* laatste...

p. 75 *Carpodactus erythrinus*

Inlassen : v 22.10, Jalhay (Luik)
k.K.B.I.N..

Inlassen :

Loxia pityopsittacus pityopsittacus -
Grote kruisbek

v 21.10 en 12.12, St.-Andries (W.-VI.)
k.K.B.I.N..

p. 76 *Hydrobates puffinus puffinus*

Lees : *Hydrobates pelagicus*

p. 76 *Cephus grylle atlantis*

Lees : *Cephus...*

BELANGRIJKE MEDEDELING VANWEGE HET B.A.H.C. (Ned.).

Het B.A.H.C. (Ned.) streeft ernaar al-
le belangrijke feiten en wijzigingen in
de avifauna van ons land ter studie te
nemen. Deze taak vraagt o.m. een nauw-
gezet op de hoogte blijven, niet alleen
van de literatuur uit eigen land, maar
ook van de steeds meer en meer versnip-
perende buitenlandse literatuur. Hier-
voor is heel wat tijd nodig.

De leden van het B.A.H.C. (Ned.) de-
den reeds dikwijls een persoonlijke na-
vraag bij de berichtgevers van interes-
sante waarnemingen, vangsten en vond-
sten, om deze nader te beschrijven. In
sommige gevallen liet een antwoord lang
op zich wachten. Het comité vraagt geen
prioriteit op de publikatie van een inte-
ressante waarneming, vangst of vondst.
Indien gepubliceerd wordt, vraagt het
comité echter dat de mededeling volledig
zou zijn, met inachtneming van hetgeen
hierover in „De Wielewaal”, jg. 30, p.
294 te vinden is. Verkiest de melder geen
publikatie maar een rechtstreekse be-
richtgeving aan het B.A.H.C. (Ned.), kan
hij zijn volledige dokumentatie verstu-
ren hetzij naar het adres van het K.B.I.
N., Vautierstraat 31, 1040 - Brussel of
naar dit van de sekretaris van het B.A.
H.C. (Ned.), Collegelaan 163, 2200 - Bor-
gerhout.

Het volgen van deze richtlijnen zal de
briefwisseling met het comité heel wat
vergemakkelijken. De leden danken bij
voorbaat alle medewerkers die deze
richtlijnen in acht kunnen nemen.

Namens het B.A.H.C. (Ned.).