


KIJK

OPMERKELIJKE ORNITOLOGISCHE WAARNEMINGEN



Met deze rubriek willen wij onze lezers op de hoogte houden van de voornaamste ornitologische gebeurtenissen uit onze omgeving. Wij doen hierbij een oproep tot de veldornitologen om hun bevindingen die de moeite lonen en meer bevatten dan een eenvoudige waarneming in het vrije veld, mee te delen.

EEN OVERZOMERING VAN DE KUIFDUIKER (*Podiceps auritus*) IN BELGIE

Op 27.06.1984 verbleef een kleine fuutachtige op het natuurreservaat 'Blokkeersdijk' te Antwerpen-Linkeroever. De waarneming gebeurde aanvankelijk in ongunstige omstandigheden, maar toch bleek dat het moeilijk om een Geoorde Fuut (*Podiceps nigricollis*) kon gaan. De sierveren aan de kopzijden vertoonden nl. het uitzicht van duidelijk afhangende 'wangen', hetgeen een determinatie van de Kuifduiker niet uitsloot.


Later kon dit vermoeden bevestigd worden bij een gunstige belichting, waarbij het onmiskenbare koppatroon en de roodbruine hals prachtig tot uiting kwamen.

Op 30.06, 04.07 en 07.07.1984 werd opnieuw een Kuifduiker in prachtkleed, naar grote waarschijnlijkheid dezelfde vogel, op het natuurreservaat 'De Kuifeend' te Oorderen (Antw.) waargenomen en op 25.07.1984 was deze vogel opnieuw aanwezig op 'Blokkeersdijk'.


Het prachtkleed had nu een ietwat versleten uitzicht en bij het uitslaan der vleugels vertoonde deze Kuifduiker duidelijke slagpenruï.

Vermits V.Beeldens, L.Janssen e.a. eveneens een Kuifduiker waarnamen op 'Blokkeersdijk' van 30.05 tot 06.06.1984 (Linkeroever 6 : 22), kan dit jaar van een doorlopende overzomering van waarschijnlijk steeds hetzelfde exemplaar worden gesproken, vanaf einde mei tot zeker einde juli.

Het merkwaardig gedrag van deze eenzame vogel op 27.06 dient vermeld. Met uitgestrekte kopsierveren hield hij de kop even naar beneden en vervolgens naar voor. Even later zwom hij met langgerekte hals, volledig



1



Schets van Kuifduiker in prachtkleed bij tegenlicht

aangedrukte kopsierveren en opgerichte 'hoorntjes' in de richting van de waarnemer. Beide houdingen zijn een uiting van het agressief gedrag, dat door Storer en Fjeldsø (in Cramp & Simmons, The Birds of the Western Palearctic, Vol. 1, 1977) uitvoerig beschreven werd. Tegenover de Geoorde Fuut, zoals verschillende keren op 'De Kuifeend' waargenomen, vertoonde deze vogel geen bijzonder gedrag.

Zomerwaarnemingen van de Kuifduiker zijn ongewoon in België. De literatuur vermeldt waarnemingen in de eerste helft van mei uit de jaren 1966, 1974, 1975, 1979 en 1982 (Aves 5 : 77, De Wielewaal 43 : 170, 171 en 48 : 71 en 312). Uitzonderlijk verschijnt de Kuifduiker reeds in augustus opnieuw, zoals dit het geval was in 1970, 1971, 1978, 1980 en 1982 (De Wielewaal 37 : 162, Aves 14 : 7, De Wielewaal 47 : 187, 49 : 324 en Veldornitol. tijdschr. 4 : 87).

Uit de tussenperiode juni-juli scheen tot heden slechts één melding bekend. Volgens Ridder van Havre (De Giervalk 22 : 148) werd op 14.07.1931 een vogel in slechte gezondheid, afkomstig uit Oelegem (Antw.) bij J. De Blicck gebracht. Door deze ornitoloog en bekend

VELDORNITHOLOG TYDSCHR 1984
BONTE STRANDLOPER 141-142 7(3)

-141-

taxidermist werd hij als Kuifduiker gedetermineerd. Van een overzomering over langere termijn was tot heden niets gepubliceerd.

SUMMARY

First summering of the Slavonian Grebe in Belgium. Apparently the same Slavonian Grebe summered from the end of May till the end of July 1984 in the Antwerp area. This bird in full summer plumage demonstrated antagonistic behaviour, as the 'attack-upright' and the 'furtive-upright'. On 25.07 wingmoult was observed. From the end of the sixties onwards, records of this species during the first half of May and during August were increasing in Belgium. There was also one previous record of a bird in bad condition in July 1931. Hitherto, summering for a long time was lacking in our country.

J. Van Impe, Borgerhout

DE BONTE STRANDLOPER (*Calidris alpina schinzii*) BROEDT VOOR HET DERDE OPEENVOLGENDE JAAR SUKSESVOL IN BELGIE

Nadat in 1982 1 paar en in 1983 2 paar Bonte Strandlopers op de linker Scheldeoever van Antwerpen met goed gevolg hebben gebroed (Van Impe & Bulteel, De Wielewaal 49 : 333-337 en Steeman, ibidem : 338-340), kon in 1984 opnieuw het broeden van deze soort vastgesteld worden in dit gebied.

Op 07.06 betraden wij een terrein, waar een paartje hevig alarmeerde. Beide ouders waren zeer stoutmoedig en lieten zich herhaaldelijk tot op 15 m benaderen. Na wat zoeken werd één pullus gevonden van enkele dagen oud, maar om verstoring te voorkomen is van een langer zoeken afgezien.

Betreffende het verenkleed van de ouders was de geringe ontwikkeling van de zwarte buikvlekken opvallend. Bij het ♂ beperkte zich de zwarte kleur tot een overlangse streep, met een oppervlakte van ongeveer 2 cm op 1 cm. Ook bij het ♀ was de zwarte bevlekking weinig uitgebreid. Zij nam de vorm aan van een onregelmatig afgelijnd hoefijzer, met een brede opening in de richting van de onderstaartdekveren. Deze vaststelling wijkt af van hetgeen werd waargenomen bij de broedvogels in 1982 en in 1983 en hetgeen o.m. door de foto van J. De Ridder (De Wielewaal 49 : 338) verduidelijkt is.

Vermoedelijk hebben in 1984 meerdere paren Bonte Strandlopers op de uitgestrekte terreinen van Antwerpen-Linkeroever gebroed. Zo werd te Kallo op 31.05 en op 03.06, ongeveer 5 km zuidwestelijk van het beschreven broedgeval, eveneens langdurig alarm genoteerd.