

our country.

J. Van Impe, Borgerhout

*DE BONTE STRANDLOPER (Calidris alpina schinzii) BROEDT
VOOR HET DERDE OPEENVOLGENDE JAAR SUKSESVOL IN BELGIE*

Nadat in 1982 1 paar en in 1983 2 paar Bonte Strandlopers op de linker Scheldeoever van Antwerpen met goed gevolg hebben gebroed (Van Impe & Bulteel, De Wielewaal 49 : 333-337 en Steeman, ibidem : 338-340), kon in 1984 opnieuw het broeden van deze soort vastgesteld worden in dit gebied.

Op 07.06 betraden wij een terrein, waar een paartje hevig alarmeerde. Beide ouders waren zeer stoutmoedig en lieten zich herhaaldelijk tot op 15 m benaderen. Na wat zoeken werd één pullus gevonden van enkele dagen oud, maar om verstoring te voorkomen is van een langer zoeken afgezien.

Betreffende het verenkleed van de ouders was de geringe ontwikkeling van de zwarte buikvlekken opvallend. Bij het ♂ beperkte zich de zwarte kleur tot een overlangse streep, met een oppervlakte van ongeveer 2 cm op 1 cm. Ook bij het ♀ was de zwarte bevlekking weinig uitgebreid. Zij nam de vorm aan van een onregelmatig afgelijnd hoefijzer, met een brede opening in de richting van de onderstaartdekveren. Deze vaststelling wijkt af van hetgeen werd waargenomen bij de broedvogels in 1982 en in 1983 en hetgeen o.m. door de foto van J. De Ridder (De Wielewaal 49 : 338) verduidelijkt is.

Vermoedelijk hebben in 1984 meerdere paren Bonte Strandlopers op de uitgestrekte terreinen van Antwerpen-Linkeroever gebroed. Zo werd te Kallo op 31.05 en op 03.06, ongeveer 5 km zuidwestelijk van het beschreven broedgeval, eveneens langdurig alarm genoteerd.



Zoals tijdens vorige jaren mag in 1984 nogmaals gewez-
zen worden op de eigenaardige broedplaats, in verge-
lijking met de gegevens die uit de literatuur ter be-
schikking staan. Bij een steeds meer in aantal terug-
lopende ondersoort zou men immers verwachten dat hoge
eisen worden gesteld aan de structuur van het broed-
biotoop, hetgeen voor de Belgische broedgevallen niet
bewaardeheid wordt. *Calidris alpina schinzii* nestelt
hier op zandige tot kleiige bodems, die hier en daar
voorzien zijn van grasveldjes en schelpenstrandjes.
Ze zijn matig begroeid met velerlei plantensoorten,
zoals Ganzevoetachtigen (*Chenopodium* sp.), Behaarde
Boterbloem (*Ranunculus sardous*), soorten Klaver (*Tri-
folium* sp.), Harig Wilgenroosje (*Epilobium hirsutum*),
Bitterling (*Blackstonia perfoliata*), distels (*Cirsium
arvense* en *C. lanceolatum*) en Klein Hoefblad (*Tussila-
go farfara*). Is deze nieuwe aanpassing hoopvol voor
de toekomst?

SUMMARY

A new breeding record of the Dunlin in Belgium. After the first successfull
breeding records in 1982 and 1983 along the left bank of the river Scheldt
near Antwerp, breeding of the Dunlin was observed here again in 1984. One
pair reared young but nesting of other pairs was very probable. The res-
triction of the black blotches on the belly of the breeding birds was worth
mentioning.

As formerly, the breeding site did not agree with the descriptions from the
literature. Artificial raised sandy to silty soils were chosen, partly co-
vered by small patches of grasses and shells. Between other plant species,
the presence of Gosefoots, Hairy Buttercup, Clovers, Great Willowherb,
Yellow-Wort, Coltsfoot and Thistles was very obvious.

J. Van Impe, Borgerhout