

63
6

NOTES ET FAITS DIVERS

Note sur la migration d'automne de *Larus minutus* sur la côte belge.

Larus minutus se présente de plus en plus fréquemment en migration automnale en Belgique. A Zeebrugge surtout, celle-ci est facilement contrôlable depuis le môle, qui s'avance en mer d'environ 1 km. A quelques centaines de mètres plus au Nord-Est, s'étend une large plage sablonneuse, où l'espèce se rassemble à marée haute. Selon VANDE WEGHE (1962), qui a étudié minutieusement la répartition et l'accroissement numérique de la Mouette pygmée en Belgique, les points culminants de la migration automnale de *Larus minutus* se sont situés, pour les années 1958-1961, entre le 20 août et le 20 septembre ; dès 1960, on a pu dénombrer plus de 300 ex. par jour à Zeebrugge, et les maxima pour 1961 étaient respectivement de 332 ex. le 1^{er} septembre et de 393 ex. le 21 septembre.

Ce phénomène de progression se poursuit encore sur notre côte. Ainsi, le 15 septembre 1964, 750 ex. se sont posés à Zeebrugge à marée haute, tandis qu'à proximité de cette concentration, 45 ex. survolaient la mer. Parmi eux le nombre des oiseaux en plumage de première année atteignait 23 %. Il est à noter que, en dépit de la forte migration automnale de 1964 en Belgique, l'espèce a été moins commune sur les côtes anglaises que les années précédentes.

A Zeebrugge, la migration automnale de 1965 bat tous les records. Une forte concentration a déjà pu être remarquée le 18 août, date à laquelle 460 ex. ont été aperçus sur le banc de sable. Ce jour-là, aucune migration ne s'est manifestée. Le 25 août, par un fort vent d'Ouest, j'ai pu dénombrer entre 9.35 h et 11.50 h, 319 ex. qui longeaient la rade. Lors de mon arrivée sur le lieu d'observation, la migration battait déjà son plein ; quand j'ai quitté ce lieu, elle continuait à un rythme très intense. Le même jour, entre 14.25 h et 15.25 h, 79 ex. se dirigeaient encore vers le Sud-Ouest et plus

tard dans l'après-midi, la migration reprenait avec la même intensité que le matin. Au moins 1.000 ex. ont passé par Zeebrugge le 25 août, estimation qui n'est nullement exagérée.

Ce sont seulement BALLANCE et LEE (1961) qui mentionnent des nombres plus élevés pour la Mouette pygmée en Europe. En effet, ces auteurs ont aperçu dans la partie Nord du Bosphore \pm 1.000 ex. entre le 19 août et le 7 septembre 1959, tandis que, selon une estimation de BATESON, 2.000 ex. y étaient présents le 30 août (*id.*).

Pour le moment, nous constatons une augmentation remarquable de l'espèce sur les trois axes de migration en Europe :

— En Europe Occidentale, comme en Angleterre et en Belgique, ainsi qu'aux Pays-Bas (*Limosa* 34 : 207.; 36 : 30 et 37 : 39).

— Plus à l'Est, le système transcontinental dans lequel le groupement Rhin-Danube paraît jouer un rôle très important (ERARD (1960 et 1960-61)); ERARD y parle d'une régularité croissante des deux passages.

— En Mer Noire, BALLANCE et LEE, se basant sur les observations plus anciennes d'ALLÉON et MOUNTFORT et FERGUSON-LEES (1961) rappelant les données de PATEFF et d'HARRISON mettent en évidence l'apparition plus fréquente de *Larus minutus*.

En analysant les causes de cette progression, l'hypothèse d'ERARD (1963) selon laquelle le recul progressif des populations vers l'Est a provoqué un déplacement plus régulier vers le Sud-Ouest, est très vraisemblable. Mais certainement aussi la présence accrue de *Larus minutus* sur les lieux de reproduction est un facteur important, qui semble primordial. Il est dommage que peu de renseignements précis sur les lieux de reproduction nous soient donnés actuellement. En Finlande, on a dénombré récemment \pm 200 couples nicheurs (KREUGER dans BLAIR, vide BANNERMAN (1962)), ce qu'on n'avait jamais observé jusqu'à ce jour.

RÉFÉRENCES

- BALLANCE, D. K. et LEE, S. L. B. (1961). — Notes on autumn migration at the Bosphorus and in the Aegean. *Ibis*, 103a, 2, 195-204.
- BANNERMAN, D. (1962). — *The Birds of the British Isles*. Vol. II, p. 238. Oliver and Boyd, London.
- ERARD, Ch. (1960). — Sur l'aire de reproduction, les zones d'hivernage et les migrations de la Mouette pygmée *Larus minutus* Pallas. *Alauda*, XXVIII : 196-228.
- ERARD, Ch. (1960-61). — Rhine-Danube as transcontinental migration routes for the Little Gull. *Aquila*, LXVII-LXVIII : 79-89.

-
- ERARD, Ch. (1963). — Compléments à l'étude des migrations de *Larus minutus* Pallas. *Alauda*, XXXI : 285-293.
- MOUNTFORT, G. et FERGUSON-LEES, I. J. (1961). — Observations on the birds of Bulgaria. *Ibis*, 103a, 3 : 443-471.
- VANDE WEGHE, J. P. (1962). — De dwergmeeuw, *Larus minutus* Pallas, in België. *Gerfaut*, 52 : 354-369.

J. VAN IMPE.

Ledeganckstraat 6, Gand, Belgique.
